





MINISTERUL PENTRU
RELAȚIA CU PARLAMENTUL

Nr.7368;7367;7366;7365;7364;7363;7362;7361;
7360;7408;7338;7337;7401;7402/28.07.2017



**Către: Domnul Corneliu-Mugurel COZMANCIUC
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la interpelări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele interpelări și o întrebare formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

Viorel ILIE



Ministrul pentru Relația cu Parlamentul



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET MINISTRU

Nr. 337 / M.R.P.
Data 27.07.2017

Nr. FB. 5803 / 25.07.2017

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebarea/interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. **417B/2017**, având ca obiect "*infestări ale spațiului verde cu populații de căpușe exofile*", vă comunicăm următoarele:

Capusele sunt insecte parazite ce populează suprafața corpului (sunt ectoparaziți) și se găsesc pe tegumentele mamiferelor (sau în blana lor), pe pielea pasarilor sau, mai rar, a reptilelor. Capusele fac parte din aceeași clasă de insecte cu scorpionii și paienjenii.

Sunt paraziți hematofagi (se hrănesc cu sangele gazdelor) și populează o singură gazdă timp de câteva zile, dacă nu sunt îndepărtate. Cele mai multe cazuri apar primăvara și vara (până târziu, spre toamnă). Mușcăturile lor sunt indolore. O parte din căpușe nu transmit boli și nici nu determină apariția unor probleme grave de sănătate gazdei. Altele însă, reprezintă principalul vector al bolii Lyme sau al unui tip particular de meningoencefalită.

Căpușele trăiesc, de obicei, în sol umbrat, umed și adesea se prind de iarba înaltă, de tufișuri, arbuști și crengile joase ale copacilor. Pajiștile și grădinile pot adăposti căpușe, mai ales cele de la marginea pădurilor și cele din preajma vechilor pereți de stâncă (zone în care trăiesc căprioarele și șoarecii, gazdele primare ale căpușei).

Ca metodă de profilaxie, specialiștii recomandă:

- Aplicarea unui spray special împotriva insectelor. Astfel de sprayuri se găsesc în farmacii dar trebuie folosite conform instrucțiunilor de pe ambalaj sau sfaturilor medicului. Există sprayuri care trebuie aplicate mai degrabă pe o piesă de îmbrăcăminte și nu direct pe piele.

- Sprayurile trebuie utilizate cu grijă în cazul copiilor (iar concentrațiile substanțelor active trebuie să fie relativ scăzute). Nu se recomandă pulverizarea lor pe mâinile copiilor (adesea copiii introduc mâna în gură și de aceea există riscul de a se intoxica cu anumite substanțe)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CABINET MINISTRU

- Protecția mecanică a tegumentelor prin acoperirea unei suprafețe cât mai mari de tegument (pantaloni lungi, șosete lungi, tricouri cu manecă lungă) dacă persoana se afla într-o zonă împădurită, în iarba înaltă (locuri de predilecție pentru capuse).

În astfel de zone se recomandă ca hainele să fie cât mai deschise la culoare (căpușile sunt mai ușor de reperat pe haine deschise prin contrastul de culoare).

- Purtarea mănușilor de menaj sau a altor mănuși speciale în cazul în care persoana manipulează animale sau păsări ce pot fi infectate

- Curățarea permanentă a habitatului: tăierea ierbii, pulverizarea de insecticide, greblarea frunzelor uscate, îndepărtarea eventualelor plante care pot atrage căpușele. Se recomandă utilizarea unor insecticide netoxice, care să nu dăuneze mediului și care să nu fie periculoase pentru sănătatea celor din jur.

- Evitarea zonelor cu cazuri cunoscute și raportate de muscăături de capușe sau de boli transmise de acestea.

Activitatea cabinetelor medicale veterinare este subordonată Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) și controlată de Direcțiile Sanitar Veterinare județene.

Cu stimă,

MINISTRU

FLORIAN DOREL BODOG

**DOMNULUI DEPUTAT BOGDAN IONEL
CAMERA DEPUTAȚILOR**